

Barium Swallow


A barium swallow is an x-ray test that checks for problems in your throat, esophagus, stomach and small intestine. You drink white chalky liquid called barium to get pictures on x-rays.

If you are breastfeeding, pregnant, or think you might be, tell the staff before the x-rays are taken.

Arrive on time for your test. The test takes about 15 to 45 minutes. You may need to stay for up to 6 hours for more x-rays if your small intestine is being looked at.

To Prepare

- Do not eat or drink anything, including water, after midnight before the test.
- Do not smoke after midnight before the test.
- If you need to take your medicines the morning of the test, take them with sips of water only.




바륨 조영검사

바륨 조영검사란 목구멍, 식도, 위장 또는 소장엔 문제가 있는지 검사하는 엑스레이 촬영입니다. 환자는 바륨이라고 불리는 회백색 액체를 마신 후 엑스레이를 찍습니다.

수유 중이거나, 임신 중이거나, 또는 임신했을지도 모른다고 생각되면, 엑스레이 찍기 전에 직원에게 알려주십시오.

검사 받는 날 제 시간에 도착하십시오. 검사는 약 15-45분 걸립니다. 소장까지 검사하려면 엑스레이를 더 찍어야 하기 때문에 6시간까지 걸릴 수 있습니다.



검사 전

- 검사 전날 자정 이후에는 물을 포함하여 아무것도 먹거나 마시지 않는다.
- 검사 전날 자정 이후에는 담배를 피우지 않는다.
- 검사 받는 날 아침에 약들을 먹어야 할 때는 물을 약간만 들어 약을 삼킨다.

During the Test

- You will be given a hospital gown to wear and be told to remove all jewelry.
- You are given 1 or 2 barium drinks. The drink tastes chalky and may be flavored.
- X-rays are taken as the barium flows down your esophagus into your stomach. You may need to stand or lie on a table for the x-rays. The table is moved in many positions. As you move, the barium coats the inside of your stomach and intestines. More x-rays are taken as the barium moves through your body.
- If you are to have x-rays of your small intestine, it may take up to 6 hours to complete your test.

After the Test

- Your stool will be light colored for 2 to 3 days after the test.
- Drink 6 to 8 glasses of liquids after the test. This will help remove the barium from your body and keep you from being constipated.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

Call your doctor if you have:

- Barium in your stool 3 days after the test
- Thin stool or notice a change in your bowel habits
- Stool that is not normal in 3 days
- Pain in your lower abdomen or stomach

검사 중

- 병원에서 준 가운을 입고 차고 있는 모든 귀금속류는 뺀다.
- 바륨을 한모금 또는 두모금 마신다. 맛이 텁텁하기 때문에 맛을 첨가하는 수도 있다.
- 바륨이 식도를 통하여 위장으로 흘러가는 과정을 엑스레이로 찍는다. 엑스레이를 찍기 위해서 검사대에 서있거나 누워있어야 한다. 검사대는 여러 위치로 움직일 수 있다. 환자가 움직이면서 바륨이 위장과 창자 내를 덮게 된다. 바륨이 몸 안에서 이동하면서 엑스레이를 추가로 더 찍는다.
- 소장 엑스레이도 찍을 경우에는 검사 하는데 6시간까지 걸릴 수 있다.

검사 후

- 검사 후 2-3일 동안은 대변이 약간 허영게 된다.
- 검사 후 6-8컵의 물을 마신다. 이렇게 하면 몸 안에 바륨이 제거되고 변비를 예방할 수 있다.
- 검사 결과는 의사에게 보내진다. 의사가 결과를 환자에게 알려준다.

아래와 같은 경우 의사에게 연락:

- 검사 후 3일이 지났는데도 바륨이 대변에 묻어 나온다
- 대변이 가늘게 나오거나 대변 습관이 변했다
- 3일이 지났는데도 대변이 비정상이다
- 아랫배나 위장에 통증이 있다

Call your doctor right away if you:

- Have trouble breathing
- Cannot stop vomiting
- See blood when you vomit or have blood in your stool

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

아래와 같은 경우 의사에게 즉시 연락:

- 숨쉬기가 힘들다
- 구토가 멈추지 않는다
- 구토할 때 피가 섞여 나오거나 대변에 피가 섞여있다

질문이나 문제가 있으면 의사나 간호사와 상담하십시오.

2006 – 11/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Barium Swallow. Korean.