

Biopsy

A biopsy is the removal of pieces of tissue, which are then sent to a lab for testing. A biopsy may be done during surgery to check for cancer or other problems. Any part of the body, such as the skin, an organ or a lump can be tested. An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site. Your doctor will review the results of your biopsy with you at your next visit and talk to you about treatment if needed.

If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the staff before the test.

If you are pregnant or think you might be, tell the staff before the test.

Arrive on time for your test. You may be told to arrive 30 minutes before your appointment time.

To Prepare

- Do not take aspirin or ibuprofen (Advil, Motrin) for one week before the biopsy.
- Check with your doctor about taking your medicines including prescription and over the counter medicines, herbals, vitamins and other supplements.

During the Test

- You will lie on a table and may wear a hospital gown.
- An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site.

Biopsy

Ang biopsy ay ang pagtatanggal ng mga piraso ng tissue, na ipapadala pagkatapos sa laboratoryo para sa pagsusuri. Maaaring isagawa ang isang biopsy sa panahon ng operasyon upang suriin kung may kanser o iba pang mga problema. Maaaring suriin ang anumang bahagi ng katawan, gaya ng balat, o organo o bukol. Maaaring magsagawa ng x-ray, CT scan o ultrasound upang hanapin ang bahagi kung saan gagawin ang biopsy. Susuriin ng inyong doktor ang mga resulta ng inyong biopsy kasama ninyo sa susunod ninyong pagbisita at tatalakayin sa inyo ang pangagamot kung kinakailangan.

Kung mayroon kayong anumang mga allergy sa mga gamot, pagkain o iba pang mga bagay, sabihin sa mga kawani bago ang pagsusuri.

Kung kayo ay nagdadalang-tao o nagsususpetsa na maaaring nagdadalang-tao kayo, sabihin sa mga kawani bago ang pagsusuri.

Pumunta sa tamang oras para sa inyong pagsusuri. Maaaring ibilin sa inyo na dumating nang 30 minuto bago ang takdang oras ng inyong appointment.

Upang Makapaghanda

- Huwag uminom ng aspirin o ibuprofen (Advil, Motrin) isang linggo bago ang biopsy.
- Kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa pag-inom ng inyong mga gamot kabilang ang mga may reseta at walang reseta gamot, herbal, bitamina at iba pang mga supplement.

Habang Isinasagawa ang Pagsusuri

- Hihiga kayo sa isang mesa at maaaring magsuot ng hospital gown.
- Maaaring magsagawa ng x-ray, CT scan o ultrasound upang hanapin ang bahagi kung saan gagawin ang biopsy.

Biopsy. Tagalog.

- The site is cleaned.
- Numbing medicine is put into the skin. This may sting.
- When the site is numb, a small needle is put into the area to be tested. Tissues and cells are removed. In some cases a small incision is made so that tissue or a lump can be removed and tested.
- If you feel any discomfort, tell the doctor.
- Pressure is applied, then a bandage. If an incision was made, you may have stitches.

After the Test

- You may have bruising, discomfort or swelling at the biopsy site.
- If needed, use over the counter pain medicine that does not contain aspirin.
- Apply an ice pack to the site as needed for the first 24 hours to reduce swelling and bruising. Do not apply ice directly to the skin. Wrap the ice pack in a pillowcase or towel. Apply the ice for 15 minutes every hour.
- Avoid strenuous activity and lifting over 5 pounds for 24 hours. You may resume normal activities unless otherwise instructed.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

- Lilinisin ang bahaging ito.
- Maglalagay ng pampamanhid na gamot sa balat. Maaaring sumakit ito nang pansamantala.
- Kapag namanhid na ang bahaging ito ng katawan, may maliit na karayom na ilalagay sa bahaging susuriin. Tatanggalin ang mga tissue at mga selula. Sa ilang mga kaso gagawa ng maliit na hiwa upang matanggal ang tissue o bukol at masuri ito.
- Kung makaramdam kayo ng bahagyang kawalang-ginhawa, sabihin sa doktor.
- Didiinan ang bahagi, pagkatapos ay lalagyan ng benda. Kung nagsagawa ng paghiwa, maaari kayong magkaroon ng mga tahi.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Maaaring magkaroon kayo ng pagpapasa, kawalang-ginhawa o pamamaga sa bahagi kung saan isinagawa ang biopsy.
- Kung kinakailangan, gumamit ng mga gamot na walang lamang aspirin na pantanggal ng sakit at nabibili nang walang reseta.
- Dampian ng ice pack kung kinakailangan sa unang 24 na oras upang mabawasan ang pamamaga at pagpapasa. Huwag idampin ang mismong yelo sa balat. Balutin ang ice pack sa isang punda o tuwalya. Idampi ang yelo nang 15 minuto bawat oras.
- Iwasan ang nakakapagod na mga gawain at pagbubuhat ng higit sa 5 pounds sa loob ng 24 na oras. Maaari ninyong gawin muli ang mga karaniwang gawain maliban kung ipinagbawal ito.
- Ipapadala ang mga resulta ng pagsusuri sa inyong doktor. Ibahagi sa inyo ng inyong doktor ang mga resulta.

Call your doctor if you have:

- Bleeding, drainage, increased swelling, redness or warmth at the site
- Pain not relieved by over the counter pain medicine

Talk to the staff if you have any questions or concerns.

Tawagan ang inyong doktor kung mayroon kayong:

- Pagdurugo, paglabas ng nana, lumulubhang pamamaga, pamumula o pag-iinit sa bahaging ginawan ng biopsy
- Sakit na hindi naiibsan ng gamot na nabibili nang walang reseta

Kausapin ang mga kawani kung mayroon kayong mga katanungan o alalahanin.

2007 – 11/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Biopsy. Tagalog.