


# Colposcopy

A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for cells that are not normal. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells that need to be checked further. The doctor uses a magnifying scope to check the tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a biopsy, may be removed to be checked in the lab.

**Arrive on time for your test.** The test takes about 15 to 20 minutes. Plan to be here about 2 hours.




## To Prepare

- Do not schedule your test during your menstrual period if possible.
- Do not have vaginal intercourse, use tampons or douche 1 to 2 days before your test.

# Soi Âm Đạo

Soi âm đạo là một thử nghiệm để kiểm tra tế bào bất thường trong âm đạo và cổ tử cung. Quý vị có thể cần được soi âm đạo nếu khám chất nhầy ở âm đạo cho thấy có tế bào cần được kiểm tra thêm. Bác sĩ dùng kính phóng đại để tìm tế bào bất thường của âm đạo và cổ tử cung. Một mẫu tế bào nhỏ, gọi là sinh thiết, có thể được lấy ra để kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

**Đến đúng giờ cho thử nghiệm.** Thử nghiệm cần khoảng 15 đến 20 phút. Dự tính ở đó khoảng 2 tiếng.



## Để chuẩn bị

- Nếu có thể, xin đừng lấy hẹn làm thử nghiệm trong khi đang có kinh nguyệt.
- Xin đừng làm tình qua âm đạo, hãy dùng tampon hoặc nước rửa douche 1 đến 2 ngày trước khi thử nghiệm.

- Take an ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol) tablet before going to your appointment. Do not use ibuprofen if you are pregnant.

## **During the Test**

- You may wear a hospital gown.
- You are helped onto the exam table. Lie down on your back and put your feet in the stirrups.
- A metal speculum is placed in your vagina to hold the walls of your vagina open. This helps your doctor to see your cervix.
- Your cervix may be covered with a weak vinegar solution to make the cells that are not normal show up. This may tingle or sting.
- The doctor checks your vagina and cervix for cells that are not normal.
- If your doctor wants to take tissue samples from the cervix, you will feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.
- Any bleeding is stopped with pressure and a chemical solution.

## **Your Care at Home**

- Stay quiet and rest for 24 hours.
- Take ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol) every 4 hours, if needed, for cramping or pain. Do not use ibuprofen if you are pregnant.
- If you had a biopsy, you may have a small amount of bloody vaginal discharge for a day. You may wear a pad.
- **Do not** have sexual intercourse, use tampons or douche until bleeding stops.
- You may take a shower. Do not take a tub bath for 3 days. This increases your chance for infection.

- Dùng thuốc viên ibuprofen (Advil, Motrin) hoặc acetaminophen (Tylenol) trước khi hẹn. Đừng dùng ibuprofen nếu đang mang thai.

### **Trong khi thử nghiệm**

- Quý vị có thể mặc áo choàng bệnh nhân.
- Quý vị được đỡ lên nằm bàn khám. Nằm ngửa và để chân lên đồ đỡ chân.
- Mở vạt hai lá bằng kim loại được đặt vào âm đạo của quý vị để giữ thành âm đạo mở rộng. Điều này giúp bác sĩ thấy cổ tử cung của quý vị.
- Cổ tử cung được bôi dung dịch dấm nhẹ để tế bào bất thường sẽ hiện ra. Điều này không làm nhột hoặc đau.
- Bác sĩ khám âm đạo và cổ tử cung của quý vị để tìm tế bào bất thường.
- Nếu bác sĩ muốn lấy mẫu tế bào từ cổ tử cung, quý vị sẽ cảm thấy hơi đau và bị chuột rút thật đau. Sẽ hết trong khoảng 1 phút.
- Áp lực và một dung dịch hóa học sẽ làm ngưng chảy máu.

### **Chăm sóc tại nhà**

- Giữ im lặng và nghỉ ngơi trong 24 tiếng đồng hồ.
- Dùng ibuprofen (Advil, Motrin) hoặc acetaminophen (Tylenol) mỗi 4 tiếng, nếu cần, để trị đau hoặc rút chuột. Đừng dùng ibuprofen nếu đang mang thai.
- Nếu làm sinh thiết, quý vị có thể thấy chút ít máu lẫn trong huyết trắng trong vòng một ngày. Quý vị cần mang băng vệ sinh.
- **Đừng** làm tình, dùng tampon hoặc nước rửa douche cho đến khi không còn thấy máu chảy.
- Quý vị có thể tắm vòi sen. Đừng tắm bồn trong 3 ngày. Điều này gia tăng nguy cơ bị nhiễm độc.

## **Call your doctor right away if you have:**

- A large amount of bleeding where you soak a pad in an hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.4 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has a strange odor

## **Follow Up**

A follow up visit will be scheduled for you. At this appointment, your doctor will talk to you about your test results and discuss treatment if needed.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

## **Gọi bác sĩ ngay nếu quý vị bị:**

- Chảy máu nhiều, thấm ướt miếng băng trong một tiếng
- Chuột rút nơi bụng hoặc đau nặng
- Rét run hoặc sốt 100.4 độ F hoặc 38 độ C
- Huyết trắng từ âm đạo có mùi lạ

## **Khám theo dõi**

Khám theo dõi sẽ được sắp xếp cho quý vị. Tại buổi hẹn này, bác sĩ của quý vị sẽ nói chuyện với quý vị về kết quả của thử nghiệm và bàn thảo về chữa trị nếu cần thiết.

**Bàn với bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào.**

2006 – 11/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from [www.healthinfotranslations.org](http://www.healthinfotranslations.org) for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Colposcopy. Vietnamese.