

니트로글리세린

Nitroglycerin

Nitroglycerin is a medicine used to treat chest pain called angina. Take nitroglycerin as directed by your doctor.

- If you are pregnant or breastfeeding, talk to your doctor before using this medicine.
- Always keep your nitroglycerin with you.
- This medicine may make you dizzy or lightheaded when you stand up or get out of bed. Get up slowly from a sitting or lying position.
- Ask your doctor if it is safe for you to drink alcohol while using nitroglycerin medicine.
- Keep nitroglycerin in its original bottle to keep its strength. Store it at room temperature away from moisture and heat.
- Be sure to replace the bottle if it has passed the expiration date.
- Keep the medicine out of the reach of children.

If you use tablets:

1. When you have chest pain, sit down and rest. Place 1 tablet under your tongue and let it dissolve. Do not swallow, chew or crush the tablet.
2. If you still have chest pain after 5 minutes, put a second tablet under your tongue.
3. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, use a third tablet. You may take up to 3 tablets in 15 minutes.

니트로글리세린은 소위 협심증을 치료하는 약입니다. 의사의 지시대로 니트로글리세린을 드십시오.

- 현재 임신 중이거나 모유 수유 중이면 이 약을 사용하기 전에 담당의와 먼저 상의하십시오.
- 니트로글리세린은 항상 갖고 다니십시오.
- 이 약을 먹으면 앉았다 일어서거나 침대에서 일어날 때 어지러울 수 있습니다. 앉았다 일어나거나 누웠다가 일어날 때 천천히 일어나십시오.
- 니트로글리세린 복용 중에 술을 마셔도 괜찮은지 담당의에게 물어보십시오.
- 니트로글리세린의 약효를 보존하려면 원래 용기에 넣어두십시오. 습기와 열이 없는 실온에서 보관하십시오.
- 유효일이 지난 병은 반드시 교체하십시오.
- 약을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

정제 약을 사용할 때:

1. 가슴 통증이 있으면, 앉아 쉬십시오. 혀 밑에 1 정을 놓고 녹이십시오. 정제를 삼키거나, 씹거나, 또는 깨물어 먹지 마십시오.
2. 5분이 지나도 가슴에 통증이 계속 남아 있으면 한 알 더 혀 밑에 넣으십시오.
3. 그 후 5분이 더 지났는데도 가슴의 통증이 사라지지 않으면, 한 알 더 넣으십시오. 15 분 동안 세 알까지 넣을 수 있습니다.

4. If you still have pain, call 911. Do not drive yourself or have someone drive you to the hospital in a private car because you may be having a heart attack. Your condition could get worse on the way to the hospital.
5. If you have aspirin, chew 1 adult tablet (325 mg) or 4 baby aspirin tablets.

If you use spray:

1. When you have chest pain, sit down and rest. Hold the can up with the spray button on top as close to your mouth as you can. Press down on the button and spray the medicine into your mouth towards the back of your throat.
2. If your chest pain lasts longer than 5 minutes, spray a second dose into your mouth.
3. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, spray a third dose. You may use up to 3 sprays in 15 minutes.
4. If you still have pain, call 911. Do not drive yourself or have someone drive you to the hospital in a private car because you may be having a heart attack. Your condition could get worse on the way to the hospital.
5. If you have aspirin, chew 1 adult tablet (325 mg) or 4 baby aspirin tablets.

4. 그래도 통증이 남아있으면 911에 전화하십시오. 심장 마비가 있을 수 있으므로 직접 운전하거나 또는 자가용으로 다른 사람에게 병원까지 운전해 달라고 하지 마십시오. 상태가 병원에 가는 도중에 악화될 수 있습니다.
5. 아스피린이 있는 경우, 성인용 1 정 (325 mg) 또는 아동용 아스피린 4 정을 씹으십시오.

스프레이를 사용할 때:

1. 가슴 통증이 있으면, 앉아 쉬십시오. 스프레이 버튼을 위로 하여 입에 최대한 가깝게 캔을 들어 올리십시오. 버튼을 누르고 목 뒤쪽을 향해 약을 입에 뿌리십시오.
2. 가슴 통증이 5분 이상 지속되면, 입 안에 한 번 더 약을 뿌리십시오.
3. 그 후 5분이 더 지났는데도 가슴의 통증이 사라지지 않으면, 한 번 더 약을 뿌리십시오. 15분 동안 세 번까지 뿌릴 수 있습니다.
4. 그래도 통증이 남아있으면 911에 전화하십시오. 심장 마비가 있을 수 있으므로 직접 운전하거나 또는 자가용으로 다른 사람에게 병원까지 운전해 달라고 하지 마십시오. 상태가 병원에 가는 도중에 악화될 수 있습니다.
5. 아스피린이 있는 경우, 성인용 1 정 (325 mg) 또는 아동용 아스피린 4 정을 씹으십시오.

Call your doctor or 911 right away if you have:

- Trouble breathing
- Increased chest pain
- Dizziness, fainting or severe weakness
- Sweaty, pale skin
- Severe headaches
- Itching or swelling
- Seizures or coma
- Blurred vision
- Dry mouth

Talk to your doctor, nurse or pharmacist if you have any questions or concerns about taking nitroglycerin.

다음의 경우 담당의나 911에 즉시 전화하십시오:

- 숨가쁨
- 가슴 통증 증가
- 현기증, 실신 또는 심한 쇠약
- 땀이 나고, 창백한 피부
- 심한 두통
- 가려움증 또는 부기
- 발작 또는 혼수
- 시야 흐려짐
- 입 마름

니트로글리세린에 관하여 궁금한 점이 있거나 걱정이 있으면 담당의나 간호사 또는 약사와 상의하십시오.