

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucous in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend that you have an O&P test to check for parasites.

検便による寄生虫検査 (O&P)

この検査では、研究所で便のサンプルを調べることによって消化管に寄生虫および寄生虫卵がないかどうかを調べます。寄生虫は他の器官の内外でも生息できます。治療は、見つかった寄生虫の種類によって異なります。

寄生虫は口または皮膚から体内に入ります。多くの場合、寄生虫がいる水を飲んだり食物を食べたりすることによって感染します。多くの寄生虫は小さいために肉眼では見えず、水や食品の中にも、味や匂いでは分かりません。寄生虫は皮膚から、または感染した虫に刺されることによって体内に侵入することもあります。

兆候

一般的には以下のような症状が現れます。

- 下痢
- 出血を伴う下痢
- 粘液を含む便
- 腹痛または腹部のけいれん
- 放屁
- 嘔吐
- 頭痛
- 発熱

これらの兆候が現れたら、できる限り早く主治医の診察を受けてください。寄生虫がいないかどうか、O&P検査を受けることを勧められる場合があります。

O&P Test

You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked (✓)**:
 - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
 - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
 - Take the sample to the doctor's office.
 - Take the sample to the lab at:

Your Care

If you have parasites, your treatment may include taking medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

寄生虫検査

_____ 回分の便のサンプルを採取する必要があります。1 度の排便で 1 回分のサンプルを採取します。数日かかってもかまいません。

- 便を採取するためにトイレに置くプラスチック トレイが渡される場合もあります。 トレイがない場合は、サランラップなどプラスチック製のラップを便器にかぶせます。 余裕を持たせながらラップを便器にかぶせて、便がトイレの中に落ちないように便座のところで押さえます。
- 便のサンプルに尿、水、トイレットペーパーが入らないようにしてください。
- 便のサンプルの一部を清潔な容器に入れます。 手を洗います。
- **チェックマーク (✓) が入っている項目の指示に従ってください。**
 - サンプルは液体が入った特別な容器に入れてください。 液体は子供やペットの届かないところに保管し、取り扱いに注意してください。 **液体は有毒です。**
 - 容器に入れたサンプルは病院または研究所に持っていくまで冷蔵庫で保存してください。
 - サンプルを病院に持ってきてください。
 - サンプルを以下の研究所に持ってきてください。

処置

寄生虫がいる場合、治療方法には薬の服用や脱水症状を予防するための大量の水分摂取などがあります。

How to Prevent Parasites

- Avoid food and water that may have parasites.
- Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of parasites to others.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

寄生虫の感染を防ぐには

- 寄生虫がいる可能性のある食物や水は避ける。
- 手をまめに洗う。食事の前後やトイレの後は手を洗いましょう。こうすることで自分自身と周りの人への拡散を防ぐのに役立ちます。

質問や不明な事項については、主治医または看護師にご相談ください。

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Stool Test OP. Japanese.