

# Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

## Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucous in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend that you have an O&P test to check for parasites.

# Examen de deposiciones para verificar la presencia de huevos y parásitos (O y P)

Este examen busca parásitos y sus huevos en el tracto digestivo al examinar una muestra de deposiciones en un laboratorio. Un parásito vive en el interior o exterior de otro organismo. El tratamiento se basará en el tipo de parásito que se encuentre.

Los parásitos entran al cuerpo a través de la boca o de la piel. La mayoría de las personas se infectan al beber agua o ingerir alimentos que tienen parásitos. La mayoría de los parásitos son demasiado pequeños para verse y no se pueden saborear u oler en el agua o en los alimentos. Éstos pueden entrar al cuerpo a través de la piel o picaduras de insectos infectados.

## Signos

Los signos más comunes son:

- diarrea;
- diarrea con sangre;
- mucosidad en las deposiciones;
- dolor o calambres abdominales;
- gases;
- náuseas;
- dolores de cabeza;
- fiebre.

Consulte con su médico apenas note estos signos. Su médico podrá recomendar que se someta a este examen para ver si tiene parásitos.

## O&P Test

You will need to collect \_\_\_\_\_ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked (✓)**:
  - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
  - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
  - Take the sample to the doctor's office.
  - Take the sample to the lab at:

---

---

---

## Your Care

If you have parasites, your treatment may include taking medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

## Examen de O y P

Deberá recolectar \_\_\_\_\_ muestras de deposiciones. Recolecte cada muestra de un movimiento intestinal diferente, a lo largo de uno o varios días.

- Posiblemente le den una bandeja de plástico para que use en el inodoro a fin de recoger sus deposiciones. Si no recibe una bandeja, cubra el inodoro con una envoltura de plástico como Saran. Coloque la envoltura de plástico suelta sobre el inodoro y sujétela con el asiento de manera que sus deposiciones no caigan al agua.
- **No** deje que caiga orina, agua o papel higiénico en la muestra de deposiciones.
- Ponga parte de la muestra de deposiciones en un recipiente limpio. Lávese las manos.
- Siga estos pasos **si están marcados** (✓):
  - Coloque su muestra en un recipiente especial con líquido. Mantenga el líquido lejos de los niños y mascotas, y manipúlelo con cuidado. **El líquido es un veneno.**
  - Mantenga su muestra en un recipiente en el refrigerador hasta que la pueda llevar al consultorio del médico o al laboratorio.
  - Lleve la muestra al consultorio del médico.
  - Lleve la muestra al laboratorio en:

---

---

---

## Cuidados

Si tiene parásitos, su tratamiento puede incluir tomar medicamentos y beber grandes cantidades de líquidos para evitar la deshidratación.

## **How to Prevent Parasites**

- Avoid food and water that may have parasites.
- Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of parasites to others.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

## **Cómo prevenir los parásitos**

- Evite alimentos y agua que puedan tener parásitos.
- Lávese las manos con frecuencia. Láveselas antes y después de comer, y después de usar el baño. Esto lo ayudará a protegerse y a impedir la propagación de parásitos a otras personas.

**Hable con su médico o enfermera si tiene alguna pregunta o duda.**

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from [www.healthinfotranslations.org](http://www.healthinfotranslations.org) for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Stool Test OP. Spanish.